

Дифференциальная диагностика, уход и терапия при разных заболеваниях кожи

HALOON
Фенистил

Диф. диагностика

Уход

Лечение

Пеленочный дерматит

Кандидоз, бактериальный дерматит, аллергический дерматит.

Частая смена подгузников, воздушные ванны, бережное очищение.

Защитные кремы и пасты, содержащие оксид цинка или вазелин, местные препараты с пантенолом.

Себорейный дерматит

Атопический дерматит, псориаз, микозы волосистой части головы.

Шампуни с противовоспалительными компонентами (экстракт солодки, бисаболл), увлажнение с помощью пантенола, масел, молочной кислоты.

В большинстве случаев достаточно ухода.
При выраженной себорее — поддерживающая терапия, в том числе восполнение биотина при его дефиците.

Реакции на укусы насекомых

Буллезное импетиго, крапивница, аллергический дерматит.

Охлаждение пораженной зоны, исключение повторных укусов, антигистаминные средства.

Местные антигистаминные средства.

Гель с диметиндена малеатом может снимать зуд, гиперемию и отек, подходит для детей с 1 месяца.

При выраженных местных проявлениях — системные антигистаминные препараты.

При генерализованных реакциях — ангионевротический отек, одышка — срочная госпитализация и интенсивная терапия.

Дифференциальная диагностика, уход и терапия при разных заболеваниях кожи

HALOON
Фенистил

Диф. диагностика

Уход

Лечение

Простой контактный дерматит

Аллергический контактный дерматит, химический ожог, атопический дерматит.

Исключение раздражающего фактора, промывание кожи прохладной водой, гипоаллергенный уход.

Индифферентные средства: присыпки, суспензии, пасты.
При пузырях — вскрытие с сохранением покрывки, повязки с антисептиками. После заживления — интенсивное увлажнение.

Аллергический контактный дерматит

Атопический дерматит, ирритантный контактный дерматит, микоз.

Выявление и устранение аллергенов, мягкое очищение, восстановление кожного барьера.

Ведущая роль — антигистаминная терапия.
***Диметиндена малеат** — препарат выбора у детей раннего возраста: блокирует H1-рецепторы, снимает зуд, воспаление и отек, разрешен с 1 месяца. При локальных проявлениях — в форме геля при обширных поражениях или эмульсии для точечного нанесения.*

Кратковременные курсы топических глюкокортикостероидов при выраженном воспалении.

Атопический дерматит

Контактные дерматиты, чесотка, себорейный дерматит, пищевая аллергия.

Ежедневное применение эмоленов, мягкие очищающие средства, минимизация триггеров, соблюдение температурного режима.

В острой фазе — топические глюкокортикостероиды, ингибиторы кальциневрина. Купирование зуда — приоритет.

***Диметиндена малеат** — предпочтителен у маленьких детей: обеспечивает выраженный противозудный эффект, облегчает сон, снижает тревожность, доказана безопасность и отсутствие тахифилаксии при применении до 20 дней.*

Вспомогательное лечение — фототерапия и пробиотики.